



Vaksin Pfizer Jadi Booster Anak 16-18 Tahun

Badan Pengawas Obat-obatan dan Makanan (BPOM) mengizinkan penggunaan vaksin pfizer sebagai vaksinasi *booster* Covid-19 untuk anak-anak berusia 16-18 tahun



EUA Booster Vaksin Pfizer



Diberikan untuk vaksin COVID-19 dengan *platform mRNA* yang dikembangkan oleh Pfizer-Biontech



Dosis *booster* sebanyak 1 dosis (30 mcg/0.3 mL)



Diberikan dengan interval sekurang-kurangnya 6 bulan setelah dosis kedua vaksinasi primer menggunakan Vaksin Pfizer

SELANJUTNYA >



Efikasi dosis *booster* Vaksin Pfizer terhadap anak usia 16 tahun ke atas menunjukkan

- 95,6%** dalam mencegah terjadinya COVID-19
- 93%** dalam menurunkan jumlah hospitalisasi akibat COVID-19
- 92%** dalam menurunkan risiko COVID-19 berat
- 81%** dalam menurunkan kematian karena COVID-19

Efek samping yang paling sering dilaporkan yaitu

-  Nyeri pada tempat suntikan
-  Gangguan jaringan sendi dan otot
-  Sakit kepala
-  Lymphadenopathy/pembengkakan
-  Gangguan saluran cerna

Badan POM 09-08-2022